

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟ 2017

A. ΝΕΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΦΑΙΝΑΙΘΥΛΑΜΙΝΕΣ (διεγερτική, εντακτογόνο ή παραισθησιογόνο δράση)

Μέσα στο 2017 καταγράφηκαν στοιχεία για πέντε (N=5) φαινεθυλαμίνες. Τα στοιχεία προήλθαν από το ερευνητικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ που πραγματοποιεί αναλύσεις στα λύματα στη **Ψυτάλλεια**. Τρεις φαινεθυλαμίνες, οι ΡΜΑ, ΟΜΜΑ και ΔΜΜΑ ανιχνεύθηκαν για πρώτη φορά στη χώρα μας κατά το έτος αναφοράς.

Πηγές πληροφόρησης

2-PEA / 2-Phenethylamine

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017 ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ

Η ουσία ανιχνεύθηκε σε επτά από τα δείγματα που λήφθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 8-14/03/2017.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ Ι
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΡΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017 ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ Ι
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ

<p>Η ουσία ανιχνεύθηκε σε επτά από τα δείγματα που λήφθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 8-14/03/2017.</p> <p><i>Η ΡΜΑ ταυτοποιήθηκε για <u>πρώτη φορά</u> στην Ελλάδα το 2017.</i></p>	<p>ΧΗΜΕΙΑΣ</p>
<p>PMMA</p> <p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017 ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ</p> <p>Η ουσία ανιχνεύθηκε σε επτά από τα δείγματα που λήφθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 8-14/03/2017.</p>	<p>ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ</p>
<p>Methoxyphenamine/OMMA</p> <p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017 ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ</p> <p>Η ουσία ανιχνεύθηκε σε επτά από τα δείγματα που λήφθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 8-14/03/2017.</p> <p><i>Η OMMA ταυτοποιήθηκε για <u>πρώτη φορά</u> στην Ελλάδα το 2017.</i></p>	<p>ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ</p>
<p>DMMA</p> <p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ 2017</p> <p>Η ουσία ανιχνεύθηκε σε πέντε από τα δείγματα που λήφθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 8-14/03/2017.</p> <p><i>Η DMMA ταυτοποιήθηκε για <u>πρώτη φορά</u> στην Ελλάδα το 2017.</i></p>	<p>ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ</p>

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΝΟΝΩΝ (διεγερτική δράση)

- Το 2017 καταγράφηκαν στοιχεία για έξι (N=6) υποθέσεις κατασχέσεων με καθιόνες. Δύο υποθέσεις ήταν του 2016
- Τέσσερις (N=4) καθιόνες, οι 4-CEC, N-propylnorpentedrone, 4-Methyl-N-ethylnorpentedrone και 4-Methylpentedrone ταυτοποιήθηκαν για πρώτη φορά στη χώρα μας το 2017
- Η N-propylnorpentedrone που ταυτοποιήθηκε στη χώρα μας σε περίπου έξι κιλά λευκή σκόνη, ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το έτος αναφοράς
- Σε αναλύσεις δειγμάτων στα λύματα στη Ψυτάλλεια ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας η Methedrone
- Τρεις (N=3) αναφορές χρηστών για χρήση μεφεδρόνης.

Πηγές πληροφόρησης

4-CEC

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 2016

Άλλη ονομασία: 4-Chloroethcathinone

Βάρος: 0,76 γρ.

Μορφή: Λευκή κρυσταλλική σκόνη.

Φορέας κατάσχεσης: Α.Τ. Ιαλυσού Ρόδου

Ημερομηνία κατάσχεσης: 20/11/2016

Μέθοδος εξέτασης δείγματος: GC/MS

Η 4-CEC ανιχνεύθηκε στη χώρα μας για πρώτη φορά το 2017. Την ουσία αυτή καθώς και 11 δισκία Hipnosedon, 3 δισκία Vulbegal, 1,5 γρ. ακατέργαστη κάνναβη και 0.5 γρ. ηρωίνη κατείχε άνδρας (31 ετών, Ρωσικής εθνικότητας) για προσωπική χρήση.

ΓΧΚ (ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΡΟΔΟΥ)

4-CMC/Clephedrone

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 2016

<p>Άλλη ονομασία: 4-Chloromethcathinone</p> <p>Βάρος: 8,0 γρ.</p> <p>Μορφή: Υπόλευκη ουσία που περιέχονταν σε 24 συσκευασίες</p> <p>Φορέας κατάσχεσης: Τ,Α, Ζωγράφου</p> <p>Έτος κατάσχεσης: 2016</p> <p>Μέθοδος εξέτασης δείγματος: GC/MS</p>	<p>ΓΧΚ (ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, Β ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)</p>
<p>1-phenyl-2-(propylamino)-1-pentanone (N-propylnorpentedrone)</p> <p>Άλλη ονομασία: alpha-propylaminopentiophenone</p> <p>Βάρος: . 5.830 γρ.</p> <p>Μορφή: Λευκή σκόνη. Η σκόνη περιέχονταν σε έξι πλαστικές συσκευασίες με την επιγραφή PEARL PIGMENT. Οι συσκευασίες αυτές μαζί με άλλες επτά που περιείχαν το συνθετικό κανναβινοειδές 5F-MDMB-PINACA (10.290 γρ.) απεστάλησαν μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία δεν απαγορεύεται η παραγωγή και διακίνηση αυτών των ουσιών, χωρίς ενδιάμεσους τελωνειακούς ελέγχους και δια θαλάσσης παρανόμως θα μεταφέρονταν στην Τουρκία.</p> <p>Φορέας κατάσχεσης: ΤΔΝ Αλεξανδρούπολης</p> <p>Ημερομηνία κατάσχεσης: 24/04/2017</p> <p>Μέθοδος εξέτασης δείγματος: GC/MS</p> <p><i>Η N-propylnorpentedrone ανιχνεύθηκε στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά το 2017.</i></p>	<p>ΓΧΚ (ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, Β ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)</p>
<p>4-Methyl-N-ethylnorpentedrone</p> <p>Άλλη ονομασία: NEMNP</p> <p>Μικτό βάρος: . 969,15 γρ.</p> <p>Μορφή: Συμπαγής και κρυσταλλική ουσία, τεμαχισμένη</p> <p>Φορέας κατάσχεσης: Περιφερειακή Δ/ση ΣΔΟΕ Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών & Όπλων και λοιπών ελεγχόμενων προϊόντων</p> <p>Ημερομηνία κατάσχεσης: 14/09/2017</p>	<p>ΓΧΚ (ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΥΠ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ Β')</p>

<p>Μέθοδος εξέτασης δείγματος: GC/MSD</p> <p>Ένα δέμα που περιείχε 932 γρ. 4-methyl-N-ethylnorpentedrone στάλθηκε με εταιρία ταχυμεταφορών από την Κίνα μέσω Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη με αποστολέα νεαρό άνδρα ηλικίας 30 ετών. Το δέμα παραδόθηκε στον ενδιαφερόμενο από τους υπάλληλους του ΣΔΟΕ οι οποίοι είχαν ενημερωθεί σχετικά από τις Διοικητικές Αρχές της Γαλλίας. Οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ διενέργησαν επιπλέον έρευνα στην οικία του νεαρού ατόμου όπου βρήκαν 37,15 γρ. της ίδιας ουσίας (4-methyl-N-ethylnorpentedrone) και 15,7 γρ. Κεταμίνη. Ο νεαρός άνδρας ανέφερε ότι έκανε χρήση αυτών των ουσιών και τις διακινούσε στους χώρους διασκέδασης της Θεσσαλονίκης.</p> <p><i>Η 4-Methyl-N-ethylnorpentedrone ανιχνεύθηκε στη χώρα μας για <u>πρώτη φορά</u> το 2017.</i></p>	
<p>4-Methylpentedrone</p> <p>Άλλη ονομασία: 4-MPD</p> <p>Βάρος: . 5,3 γρ. (η 4-methylpentedrone ανιχνεύθηκε σε δύο κατασχεθέντα δείγματα λευκής κρυσταλλικής ουσίας βάρους 4,46 και 0,84 γραμμάρια αντίστοιχα. Στο δείγμα βάρους 0,84 γρ. εκτός από την 4-methylpentedrone ανιχνεύθηκε και η καθιόννη 4-MEC)</p> <p>Μορφή: Συμπαγής ουσία κρυσταλλικής μορφής</p> <p>Φορέας κατάσχεσης: Α.Τ. Πολυκάστρου Κιλκίς</p> <p>Ημερομηνία κατάσχεσης: 30/03/2017</p> <p>Μέθοδος εξέτασης δείγματος: GC/MS</p> <p><i>Η 4-Methylpentedrone ανιχνεύθηκε στη χώρα μας για <u>πρώτη φορά</u> το 2017. Την ουσία κατείχε άνδρας 39 ετών για προσωπική χρήση.</i></p>	<p>ΓΧΚ (ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΥΠ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ Β')</p>
<p>2-MMC & Benzylamphetamine</p> <p>Βάρος: . 0,83 γρ.</p> <p>Μορφή: Λευκή σκόνη</p> <p>Φορέας κατάσχεσης: Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, ΤΔΝ Διεθνούς Αερολιμένα Θεσσαλονίκης</p> <p>Έτος κατάσχεσης: 2017</p> <p>Μέθοδος εξέτασης δείγματος: GC/MSD</p> <p><i>Κατασχέθηκε επίσης 0,42 γρ. λευκή σκόνη που περιείχε MDMA.</i></p>	<p>ΓΧΚ (ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΥΠ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ Β')</p>

<p>METHEDRONE/bk-PMMA</p> <p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α 2017 ΠΟ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ</p> <p>Η ουσία ανιχνεύθηκε σε επτά από τα δείγματα που λήφθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 8-14/03/2017.</p> <p><i>Η METHEDRONE ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2017.</i></p>	<p>ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ</p>
<p>MERHEDRONE</p> <p>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017</p> <p>Αριθμός αναφορών: 3 Μορφή: Κρύσταλλοι Τρόπος χρήσης: Σνιφάρισμα/ενδοφλέβια Παρενέργειες: Αϋπνία, οπτικές ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις, ιδέες συσχέτισης και αυτοαναφοράς (παραληρηματικές ιδέες) Χρήση από τους ερωτώμενους: Ναι. Ένας στους τρεις ανέφερε ότι έκανε χρήση της ουσίας για μήνες και ένας άλλος 5 γρ. την ημέρα για δύο εβδομάδες.</p>	<p>ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΙΑΝΟΣ, ΨΝΘ</p>
<p>ΑΛΑΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ</p> <p>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017</p> <p>Μορφή: Σκόνη Τρόπος χρήσης: Κατάποση Διάδοση: Ελάχιστα διαδεδεμένη ουσία Ομάδα-στόχος: Πολυχρήστες Παρενέργειες / επιδράσεις: Επιθετικότητα (κανιβαλισμός), θάνατος από καρδιακή προσβολή Χρήση από τον ερωτώμενο: Όχι</p>	<p>ΜΥΑΠ, ΟΚΑΝΑ</p>

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ)

Μέσα στο 2017 συγκεντρώθηκαν στοιχεία για δεκατέσσερις (N=14) υποθέσεις κατασχέσεων συνθετικών κανναβινοειδών. Μία υπόθεση ήταν του 2016. Τρία συνθετικά κανναβινοειδή, τα AMB-FUBINACA, ADB-FUBINACA και STS-135 ταυτοποιήθηκαν στη χώρα μας για πρώτη φορά κατά το έτος αναφοράς.

Καταγράφηκε μία κατάσχεση περίπου 10 κιλά του συνθετικού κανναβινοειδούς **5F-MDMB-PINACA**.

Από τις Διοικητικές Αρχές εντοπίστηκαν τρία (N=3) καταστήματα (φιλικατζίδικα 24ωρης λειτουργίας) στη Θεσσαλονίκη τα οποία πωλούσαν προϊόντα που περιείχαν συνθετικά κανναβινοειδή.

Σύμφωνα με τη Διοικητική Αρχή (Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης), οι προμηθευτές αυτών των προϊόντων τα αγοράζουν από το διαδίκτυο και τα παραλαμβάνουν μέσω ταχυδρομικών εταιριών (π.χ DHL, UPS, κτλ.) Στη συνέχεια τα πωλούν στους ιδιοκτήτες / διαχειριστές των καταστημάτων αυτών σε αρκετά υψηλότερη τιμή από την τιμή που τα προμηθεύονται. Η λιανική πώληση των προϊόντων αυτών γίνεται με μυστικό τρόπο.

Τα φυτικά αποσπάσματα διατίθενται στην αγορά σε συσκευασίες χωρίς ενδείξεις για να αποφεύγονται οι ανακλήσεις των προϊόντων αυτών όπως γίνονταν παλαιότερα (2012-2016) με αποφάσεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και επιπρόσθετα για να διατηρήσουν οι προμηθευτές την ανωνυμία των εταιριών από τους «πωλητές λιανικής» (καταστηματάρχες) από τις οποίες αγοράζουν μέσω διαδικτύου (dark web) τα προϊόντα αυτά.

Επίσης, υπήρξε ένα επειγόν περιστατικό σχετικά με χρήση συνθετικού κανναβινοειδούς (JWH-018) και 14 αναφορές χρηστών για χρήση συνθετικών κανναβινοειδών.

Πηγές πληροφόρησης

5F-MDMB-PINACA/5F-ADB

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 2016

Βάρος: 0,2 γρ.

Μορφή: Φυτικά αποσπάσματα γριζοπράσινου χρώματος που περιέχονταν σε μία πλαστική συσκευασία.

Φορείς κατάσχεσης: Τ.Α. Χαλανδρίου

Έτος κατάσχεσης: 2016

Μέθοδος εξέτασης δειγμάτων: GC/MS

ΓΧΚ (ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ,
Β ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ)

<p>5F-MDMB-PINACA/5F-ADB</p>	
<p>Αριθμός κατασχέσεων: 7 Συνολικό μικτό βάρος: 10.375,79 γρ. (τα 10.290 γρ. αφορά μία κατάσχεση που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη τον Απρίλιο του 2017. Σε αυτή την κατάσχεση βρέθηκαν επίσης και 5.830 γρ. της νέας καθιόνης <i>N</i>-propylnorpentadron)) Μορφή: Φυτικά αποσπάσματα/σκόνη υπόλευκου χρώματος Φορείς κατάσχεσης: ΤΔΝ Αλεξανδρούπολης, Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, ΔΑΑ/ΥΠ. ΑΣΦ. Β/Α Αττικής/ΤΜ. Κρατ. Ασφάλειας, Τ.Α. Λαυρεωτικής, Τ.Α. Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Τ.Α. Λαμίας, Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης Τομέας Ασφάλειας-Ανάκρισης Έτος κατάσχεσης: 2017 Μέθοδος εξέτασης δειγμάτων: GC/MS</p> <p><i>Παρατηρήσεις: η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε να υπαχθεί σε μέτρα ελέγχου η 5F-MDMB-PINACA η οποία αξιολογήθηκε για την επικινδυνότητα της τον Νοέμβριο του 2017.</i></p>	<p>ΓΧΚ (ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, Β ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)</p>
<p>5F-MDMB-PINACA & MDMB-CHMICA</p> <p>Βάρος: 9,3 γρ. Μορφή: Φυτικά αποσπάσματα Φορέας κατάσχεσης: ΔΑΑ/ΥΠ. ΑΣΦ. Β/Α Αττικής/ΤΜ. Κρατ. Ασφάλειας Έτος κατάσχεσης: 2017 Μέθοδος εξέτασης δείγματος: GC/MS</p> <p><i>Το MDMB-CHMICA ελέγχεται στη χώρα μας επειδή είναι ισομερές της Ζιπετρόλης.</i></p>	<p>ΓΧΚ (ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, Β ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)</p>
<p>AB-FUBINACA & 5F-MDMB-PINACA</p> <p>Βάρος: 0,4 γρ. Μορφή: Φυτικά αποσπάσματα Φορέας κατάσχεσης: Α.Τ. Αργαγγέλου Ρόδου</p>	<p>ΓΧΚ (ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ)</p>

<p>Έτος κατάσχεσης: 2017 Μέθοδος εξέτασης δείγματος: GC/MS</p>	<p>ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΡΟΔΟΥ)</p>
<p>BLACK MABA (ονομασία φυτικού προϊόντος που περιέχει σύμφωνα με στοιχεία του 2016 το συνθετικό κανναβινοειδές AB-FUBINACA)</p> <p>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017</p> <p>Αριθμός αναφορών: 2 Μορφή: Φύλλα φυτού Τρόπος χρήσης: Καπνιστή Διάδοση: Πολύ διαδεδομένο προϊόν Ομάδα στόχος: Χρήστες κάνναβης, νέοι χρήστες Παρενέργειες / επιδράσεις: «Χάσιμο μυαλού», «δεν μπορείς να κουνηθείς» Χώροι διάθεσης: Πιάτσες, διαδίκτυο Χρήση από τους ερωτώμενους: Ναι</p>	<p>ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ</p>
<p>CUMYL-5FPINACA</p> <p>Αριθμός κατασχέσεων: 2 Συνολικό βάρος: 20,12 γρ. που περιέχονταν σε δέκα (N=10) συσκευασίες πράσινου και γκρι χρώματος χωρίς ενδείξεις. Μορφή: Τριμμένα φυτικά αποσπάσματα Φορείς κατάσχεσης: Τ.Α. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, Τομέας Ασφάλειας - Ανάκρισης Έτος κατάσχεσης: 2017 Μέθοδος εξέτασης δειγμάτων: GC/MS</p> <p><i>Όλα τα δείγματα προέρχονται από ψιλικατζίδικα που λειτουργούν σε 24ώρη βάση στη Θεσσαλονίκη. Το CUMYL-5FPINACA δεν ελέγχεται στη χώρα μας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελέγχεται στη Δανία, Φιλανδία, Ιταλία, Λετονία και Σλοβενία</i></p>	<p>ΓΧΚ (ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΥΠ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ Β')</p>
<p>AMB-FUBINACA</p>	

Άλλη ονομασία: FUB-AMB**Αριθμός κατασχέσεων: 4****Συνολικό βάρος:** 9,19 γρ. που περιέχονταν σε έξι (N=6) κουτιά και ένα σακουλάκι μαύρου χρώματος χωρίς ενδείξεις**Μορφή:** Φυτικά αποσπάσματα**Φορείς κατάσχεσης:** Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, Τομέας Ασφάλειας – Ανάκρισης, Τ.Α. Ερμούπολης Σύρου**Έτος κατάσχεσης:** 2017**Μέθοδος εξέτασης δειγμάτων:** GC/MS

Το AMB-FUBINACA ανιχνεύθηκε στη χώρα μας για πρώτη φορά το 2017. Έξι στα επτά δείγματα προέρχονται από ψιλικατζίδικα που λειτουργούν σε 24ώρη βάση στη Θεσσαλονίκη.

ΓΧΚ :ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΧΗΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ, ΥΠ/ΝΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΤΜΗΜΑ Β',
ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, Β
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ

AMB-FUBINACA & 5F-AMB-PINACA**Άλλη ονομασία:** 5F-AMB για 5F-AMB-PINACA**Βάρος:** 2,5γρ.**Μορφή:** Φυτικά αποσπάσματα τα οποία περιέχονταν σε ένα με τις ενδείξεις WASTED / CHINESE SPIRITUAL EXTRACT, NOT FOR HUMAN CONSUMPTION**Φορέας κατάσχεσης:** Τ.Α. Ερμούπολης Σύρου**Ημερομηνία κατάσχεσης:** 26/04/2017**Μέθοδος εξέτασης δειγματος:** GC/MS

Την ποσότητα αυτή μαζί με άλλα τέσσερα σακουλάκια συνολικού βάρους 9,6 γρ. που περιείχαν τα συνθετικά κανναβινοειδή STS-135, 5F-AKB48 & 5F-MDMB-PINACA, ένα σακουλάκι βάρους 1,3 γρ. που περιείχε αποκλειστικά AMB-FUBINACA και 3 γρ. ακατέργαστη κάνναβη κατείχε νεαρός άνδρας ηλικίας 26 ετών για προσωπική χρήση και διακίνηση.

ΓΧΚ (ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ,
Β ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ)

5F-AKB48 & JWH-018**Άλλη ονομασία:** 5F-APINACA για 5F-AKB48**Βάρος:** . 0,28 γρ. που περιέχονταν σε μία μαύρη πλαστική συσκευασία χωρίς ενδείξεις**Μορφή:** Φυτικά αποσπάσματα

ΓΧΚ (ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΧΗΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ, ΥΠ/ΝΣΗ

<p>Φορέας κατάσχεσης: Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, Τομέας Ασφάλειας - Ανάκρισης Έτος κατάσχεσης: 2017 Μέθοδος εξέτασης δείγματος: GC/MSD</p> <p><i>Το δείγμα προέρχεται από φιλικατζίδικο που λειτουργεί σε 24ώρη βάση στη Θεσσαλονίκη. Το JWH-018 είναι ελεγχόμενη ουσία στη χώρα μας.</i></p>	<p>ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ Β')</p>
<p>ADB-FUBINACA, AMB-FUBINACA & 5F-MDMB-PINACA</p> <p>Βάρος: . 0,1 γρ. Μορφή: Φυτικά αποσπάσματα Φορέας κατάσχεσης: Α.Τ. Σχηματαρίου Ημερομηνία κατάσχεσης: 20/04/2017 Μέθοδος εξέτασης δείγματος: GC/MS</p> <p><i>Το ADB-FUBINACA ανιχνεύθηκε στη χώρα μας για <u>πρώτη φορά</u> το 2017. Το μείγμα κατείχε άνδρας ηλικίας 23 ετών, Αλβανικής εθνικότητας.</i></p>	<p>ΓΧΚ (ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, Β ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)</p>
<p>STS-135, 5F-AKB48 & 5F-MDMB-PINACA</p> <p>Άλλη ονομασία: 5F-APICA για STS-135</p> <p>Βάρος: 9,6γρ. Μορφή: Φυτικά αποσπάσματα τα οποία περιέχονταν σε τρία κόκκινα πλαστικά σακουλάκια με τις ενδείξεις ATOMIC BOMB 3G. STRAWBERRY και ένα κόκκινο πλαστικό σακουλάκι χωρίς ενδείξεις Φορέας κατάσχεσης: Τ.Α. Ερμούπολης Σύρου Ημερομηνία κατάσχεσης: 26/04/2017 Μέθοδος εξέτασης δείγματος: GC/MS</p> <p><i>Το STS-135 ανιχνεύθηκε στη χώρα μας για <u>πρώτη φορά</u> το 2017. Την ποσότητα αυτή μαζί με άλλα δύο σακουλάκια συνολικού βάρους 3,8 γρ. που περιείχαν τα συνθετικά κανναβινοειδή AMB-FUBINACA & 5F-AMB-PINACA και 3 γρ. ακατέργαστη κάνναβη κατείχε νεαρός άνδρας ηλικίας 26 ετών για προσωπική χρήση και διακίνηση.</i></p>	<p>ΓΧΚ (ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, Β ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)</p>

<p>5F-ADB-PINACA</p> <p>Βάρος: 3,7γρ. Μορφή: Φυτικά αποσπάσματα αναμειγμένα με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης τα οποία περιέχονταν σε τέσσερις αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες Φορέας κατάσχεσης: Τ.Α. Βούλας Ημερομηνία κατάσχεσης: 18/02/2017 Μέθοδος εξέτασης δείγματος: GC/MS</p> <p>Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι νεαρού άνδρα ηλικίας 24 ετών και εντόπισε ακατέργαστη κάνναβη (89,823 γρ.), κοκαΐνη (39 πακέτα) και το συνθετικό κανναβινοειδές 5F-ADB-PINACA (3,7 γρ.) για προσωπική χρήση και διακίνηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, το άτομο μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική.</p>	<p>ΓΧΚ (ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, Β ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)</p>
<p>AM-2201</p> <p>Βάρος: 1.013,5 γρ. Μορφή: Λευκή σκόνη Φορείς κατάσχεσης: Τελωνείο Κήπων Ημερομηνία κατάσχεσης: 14/03/2017 Μέθοδος εξέτασης δειγμάτων: GC/MS</p> <p><i>Αφορά συνέχεια της υπόθεσης του 2014 όπου είχαν κατασχεθεί περίπου 15 κιλά (14.800 γρ.) AM-2201 στο αυτοκίνητο ενός άνδρα Κολομβιανής εθνικότητας που προόριζε αυτή την ποσότητα για την Τουρκία. Σε περαιτέρω έλεγχο του οχήματος το 2017 βρέθηκε επιπλέον ένα κιλό περίπου αυτής της ουσίας.</i></p>	<p>ΓΧΚ (ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, Β ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)</p>
<p>BONSAI (JWH-018)</p> <p>ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2017</p> <p>Άνδρας, 42 ετών, κάπνισε την ουσία (ΑΧΑΪΑ). Συμπτώματα: Δύσπνοια, υπέρταση (216/130). Συμπτωματική αγωγή.</p>	<p>ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ</p>
<p>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017</p>	<p>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ</p>

<p>Μορφή: Φύλλα φυτού Τρόπος χρήσης: Καπνιστή Διάδοση: Λίγο διαδεδομένη ουσία Ομάδα-στόχος: Νέοι Χώροι διάθεσης: Παρέες Χρήση από ερωτώμενο: Ναι</p>	
<p>BOOM</p> <p>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017</p> <p>Αριθμός αναφορών:3 Μορφή: Φύλλα φυτού Τρόπος χρήσης: Καπνιστή Διάδοση: Πολύ διαδεδομένη ουσία Παρενέργειες / επιδράσεις: Υπερένταση, ταχυκαρδία, τάση για εμετό, αποπροσανατολισμό, «σου μαυρίζει τα δάκτυλα», «μυκητίαση στα χέρια» Χώροι διάθεσης: Πιάτσες Τιμή: €5 Χρήση από τους ερωτώμενους: Ναι (N=2), Όχι (N=1)</p> <p><i>Παρατήρηση: Προϊόν με αυτή την ονομασία το οποίο περιείχε συνθετικά κανναβινοειδή είχε κατασχεθεί από κατάστημα στη Θεσσαλονίκη το 2016.</i></p>	<p>ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝΑ- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ</p>
<p>TITANIUM</p> <p>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017</p> <p>Μορφή: Φύλλα φυτού Τρόπος χρήσης: Καπνιστή Διάδοση: Ελάχιστα διαδεδομένη ουσία Παρενέργειες / επιδράσεις: Παραισθήσεις Χώροι διάθεσης: Κλαμπς Τιμή : €40-50</p>	<p>ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝΑ- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ</p>

Χρήση από τον ερωτώμενο: Ναι

Παρατηρήσεις: Προϊόν με ανάλογη ονομασία που περιείχε συνθετικά κανναβινοειδή κατασχέθηκε το 2012 στον Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος.

ΧΗΜΙΚΟ ΧΟΡΤΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017

Μορφή: Πολύ μικρές μπαλίτσες

Τρόπος χρήσης: Καπνιστή

Διάδοση: Πολύ διαδεδομένη ουσία

Παρενέργειες / επιδράσεις: «Χάσιμο αισθήσεων, σαν να είσαι σε κώμα»

Χώροι διάθεσης: Πιάτσες

Χρήση από τον ερωτώμενο: Ναι

ΘΜΦΑΕ ΟΝΑΝΑ-
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΑΜΝΗΖΙΑ (τύπος Skunk)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017

Μορφή: Φύλλα φυτού

Τρόπος χρήσης: Καπνιστή

Διάδοση: Ελάχιστα διαδεδομένη ουσία

Ομάδα-στόχος: Νέοι

Χρήση από τον ερωτώμενο: Ναι

Σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο, διατίθενται σπόροι με παρόμοια ονομασία (zambeza).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ

HAZE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ

Μορφή: Φύλλα φυτού
Τρόπος χρήσης: Καπνιστή
Διάδοση: Πάρα πολύ διαδεδομένη ουσία
Ομάδα-στόχος: Νέοι
Χώροι διάθεσης: Παρέες
Χρήση από τον ερωτώμενο: **Ναι**

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου (EMCDDA), μία συσκευασία με την ονομασία HAZE στο Η. Βασίλειο το 2012 περιείχε το συνθετικό κανναβινοειδές AM-2233.

WHITE WIDOW HAZE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017

Μορφή: Φύλλα φυτού
Τρόπος χρήσης: Καπνιστή
Διάδοση: Ελάχιστα διαδεδομένη ουσία
Ομάδα-στόχος: Νέοι
Χώροι διάθεσης: Παρέες
Χρήση από τον ερωτώμενο: **Ναι**

Σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο, διατίθενται σπόροι με αυτή την ονομασία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ

WHITE WINDOW+AK49

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017

Μορφή: Κρυσταλλική
Τρόπος χρήσης: Καπνιστή (θρυμματίζεις την ουσία μέσα σε καπνό)
Διάδοση: Ελάχιστα διαδεδομένη ουσία
Παρενέργειες / επιδράσεις: Ψευδαισθήσεις, επιθετικότητα, «χάσιμο»
Χώροι διάθεσης: Κλαμπς
Χρήση από τον ερωτώμενο: **Ναι**

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝΑ-
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

<p><i>Παρατηρήσεις: Μπορεί να αφορά και καθινόνη επειδή οι ουσίες που καταναλώνονται στη νυχτερινή διασκέδαση είναι κυρίως διεγερτικές.</i></p>	
<p>PERPEAL HAZE, SURESCAN</p> <p>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017</p> <p>Μορφή: Φύλλα φυτού Τρόπος χρήσης: Καπνιστή Διάδοση: Πάρα πολύ διαδεδομένη ουσία Ομάδα-στόχος: Νέοι Χρήση από τον ερωτώμενο: Ναι</p> <p><i>Παρατηρήσεις: Πληροφορίες για το προϊόν PERPEAL HAZE είχα δοθεί το 2013 από την ίδια πηγή πληροφόρησης.</i></p>	<p>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ</p>
<p>Zero-zero</p> <p>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017</p> <p>Μορφή: Φύλλα φυτού Τρόπος χρήσης: Καπνιστή Διάδοση: Ελάχιστα διαδεδομένη ουσία Παρενέργειες / επιδράσεις: Ψευδαισθήσεις Χρήση από τον ερωτώμενο: Ναι</p>	<p>ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ</p>
<p>ARYLCYCLOHEXYLAMINES</p>	
	<p>Πηγές πληροφόρησης</p>

<p>Κεταμίνη ΕΤΟΣ 2017</p> <p>Αριθμός κατασχέσεων: 3 Κατασχεθείσα ποσότητα: 26,1 γρ. Τόπος κατάσχεσης: Τ.Α. Μαλεβιζίου Ηρακλείου Κρήτης, Τ.Α. Καρπενησίου, Περιφερειακή Δ/ση ΣΔΟΕ Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών & Όπλων και λοιπών ελεγχόμενων προϊόντων</p>	<p>ΣΟΔΝ-ΕΜΠ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ</p> <p>ΓΧΚ: ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΥΠ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ Β', ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, Β ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ</p>
<p>ΘΑΝΑΤΟΦΟΡΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΧΡΗΣΗ ΚΕΤΑΜΙΝΗΣ</p> <p>Άνδρας (χρήστης ουσιών), ηλικίας 20 ετών. Στα βιολογικά υλικά (ούρα, αίμα, ορός αίματος, χολή, στομάχι) ανιχνεύθηκαν 1) MDMA, 2) κοκαΐνη, 3) lidocaine, 4) midazolam, 5) ibuprofen, 6) μεταβολίτης της Ketamine (το άτομο μεταφέρθηκε σε κώμα σε Δημόσιο Νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ πριν καταλήξει).</p>	<p>ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ</p>
<p>ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 2017</p> <p>Συνολικό αριθμός: 7 (4 άνδρες και 3 γυναίκες). Κλήσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης (Γ.Ν. Ιπποκράτειο)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Άνδρας με πρόσφατη χρήση Κεταμίνης (δύο ώρες πριν προσέλθει στα Επείγοντα -15/04/2017). Συμπτώματα: Μυδρίαση, κώμα. Αγωγή: ANEXATE (φαρμακευτικό σκεύασμα, ανταγωνιστής βενζοδιαζεπινών), NARCAN ακολούθησαν έμετοι. 2. Δύο περιστατικά (Άνδρας 20 ετών και Γυναίκα 26 ετών), χρήση Special K (Κεταμίνη) οκτώ ώρες πριν προσέλθουν στα Επείγοντα (22/4/2017). Συμπτώματα: Απροσανατολισμός. Συμπτωματική Αγωγή. 3. Τέσσερα περιστατικά (2 άνδρες και 2 γυναίκες), χρήση κεταμίνης, κοκαΐνης, έκσταση και αλκοόλ (βρέθηκαν από αστυνομία 3/4/2017) Συμπτώματα: Μυδρίαση. Συμπτωματική αγωγή. Επανήλθαν προοδευτικά. 	<p>ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ</p>

Indolalkymanines (Tryptamines)	
	Πηγές πληροφόρησης
<p>5-HO-DMT</p> <p>Άλλη ονομασία: Bufotenine</p> <p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017 ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ</p> <p>Η 5-HO-DMT ανιχνεύθηκε σε έξι από τα δείγματα που λήφθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 8-14/03/2017.</p>	<p>ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ</p>
Piperazine derivatives	
	Πηγές πληροφόρησης
<p>Methoxyriperamide</p> <p>ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2017</p> <p>Άλλη ονομασία: MEXP</p> <p>Πρώην χρήστης 21 ετών από Β. Ελλάδα (Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης -16/7/2017). Συμπτώματα: Υπνηλία. Συμπτωματική Αγωγή.</p> <p><i>Η ουσία Methoxyriperamide αναφέρθηκε για <u>πρώτη φορά</u> στην Ελλάδα το 2017.</i></p>	<p>ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ</p>

ΟΠΙΟΕΙΔΗ	
	Πηγές πληροφόρησης
CARFENTANIL	
<p>Το περιστατικό συνέβη στις 23 Νοεμβρίου σε νεαρό άνδρα (26 ετών) στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου.</p> <p>Προσήλθε σε κώμα με αναπνευστική καταστολή, διασωληνώθηκε, εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας όπου του έγιναν αρχικά 2-3 αμπούλες Naloxone χωρίς ανταπόκριση. Επανήλθε την επόμενη ημέρα (24/11) και παρέμεινε μέχρι στις 25/11 νοσηλευόμενος στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Από τις 26 /11 νοσηλεύτηκε σε παθολογική κλινική. Τα συμπτώματα που παρέμειναν (από τις 27/11) ήταν διαταραχές όρασης και αστάθεια.</p> <p>Ο ίδιος όταν βγήκε από το κώμα έδωσε στοιχεία για το προϊόν που αγόρασε μέσω διαδικτύου. Είναι κόκκοι σαν αλάτι. Το έλαβε με εισπνοή και ονομάζεται carfentanil. Ανέφερε ότι είναι ναρκωτικό του δρόμου πολύ ισχυρό και ότι προμηθεύτηκε ένα φακελάκι έναντι 200 ευρώ. Είχε πάρει αρχικά ένα κόκκο σε δεύτερη χρήση δύο κόκκους και στην τρίτη χρήση περίπου 10 . Ανέφερε ότι το έκανε για να αυτοκτονήσει.</p> <p>Ο νεαρός έχει ιστορικό κατάθλιψης και έχει κάνει κατάχρηση τεστοστερόνης για να βελτιώσει την «εικόνα» του.</p>	<p>ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ</p>
TRAMADOL	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017 ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ	
<p>Αριθμός κατασχέσεων: 5 Αριθμός δισκίων: 59 Φορείς κατασχέσεων: ΑΤ Πολυκάστρου, ΤΔΝ Σερρών, ΤΑ Σταυρούπολης, ΑΤ Ν. Μουδανιών</p>	<p>ΓΧΚ (ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)</p>

<p>ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 2017</p> <p>Η TRAMADOL ανιχνεύθηκε στα βιολογικά υλικά (αίμα) τριών (N=3) οδηγών που ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα. Τα τροχαία ατυχήματα έλαβαν χώρα στην περιοχή της Αττικής. Οι οδηγοί είναι ζωντανοί.</p>	<p>ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ</p>
<p>ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ TRAMADOL ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017)</p> <p>Άνδρας 53 ετών, χρήστης ναρκωτικών. Στα βιολογικά υλικά (ούρα) μεταξύ άλλων (οπιούχα παράγωγα, βενζοδιαζεπίνη, άλλα αναλγητικά) ανιχνεύθηκε η ουσία tramadol. Αιτία θανάτου: Ισχαιμία μυοκαρδίου συνεπεία λήψης εξαρτησιογόνων ουσιών (ηρωίνη) και φαρμάκων. Ο θάνατος συνέβη σε περιοχή της Αττικής.</p>	<p>ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ</p>
<p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017 ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ</p> <p>Η TRAMADOL ανιχνεύθηκε σε επτά από τα δείγματα που λήφθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 8-14/03/2017.</p>	<p>ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ</p>
<p>ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ</p>	
	<p>Πηγές πληροφόρησης</p>
<p>QUETIAPINE</p>	
<p>ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ</p> <p>Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πέντε (N=5) θάνατοι σχετίστηκαν με τη χρήση quetiapine, από τους οποίους οι τρεις (N=3) συνέβησαν το 2016 και οι δύο (N=2) το 2017 στην Αττική. Όλοι οι θανόντες ήταν άνδρες των οποίων η ηλικία κυμαίνονταν μεταξύ 26 και 54 ετών. Στα βιολογικά υλικά των θανόντων, εκτός από quetiapine, ανιχνεύθηκαν οπιούχα και άλλα φάρμακα (αγχολυτικά, αντιψυχωσικά, αντιεπιληπτικά, κτλ). Τα καρδιακά νοσήματα σε συνεργιακή δράση με τη λήψη ουσιών είναι η κύρια αιτία των θανάτων.</p>	<p>ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ</p>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016 - ΑΤΤΙΚΗ: ΤΡΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ QUETIAPINE ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

1. Άνδρας ηλικίας 39 ετών, χρήστης ναρκωτικών. Στα βιολογικά υλικά (ούρα και αίμα) ανιχνεύθηκαν 1) valproic acid (αντιεπιληπτικό), 2) μορφίνη, κωδεΐνη (οπιούχα παράγωγα), 3) diazepam, nordazepam (βενζοδιαζεπίνες), 4) **quetiapine** (ούρα), 5) sertraline (αντικαταθλιπτικό), 6) olanzapine (αντιψυχωσικό), 8) κοκαΐνη και μεταβολίτες της. Αιτία θανάτου: Ισχαιμία του μυοκαρδίου, λήψη εξαρτησιογόνων ουσιών.
2. Άνδρας ηλικίας 54 ετών. Στα βιολογικά υλικά (ούρα και αίμα) ανιχνεύθηκαν 1) codeine, meconin, morphine, 6 MAM, μεταβολίτης της paraverine (οπιούχα παράγωγα), 2) flunitrazepam (βενζοδιαζεπίνη-αγχολυτικό και υπνωτικό φάρμακο), 3) **quetiapine** (ούρα), 4) παρακεταμόλη, 5) οινόπνευμα 0,34 ‰ (gr/Lt). Αιτία θανάτου: βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κακώσεις αυχένος και θώρακος (κατά πληροφορίες, παράσυρση από τρένο).
3. Άνδρας ηλικίας 26 ετών, χρήστης ναρκωτικών. Στα βιολογικά υλικά (ούρα και αίμα) ανιχνεύθηκαν 1) 6 MAM μεταβολίτης της ηρωίνης, 2) diazepam, nordazepam, temazepam (βενζοδιαζεπίνες-αγχολυτικά και υπνωτικά φάρμακα), 3) **quetiapine** (ούρα), 4) citalopram (αντικαταθλιπτικό), 5) οινόπνευμα 2,05‰ (gr/Lt). Αιτία θανάτου: οίδημα πνευμόνων, πρόσφατη ισχαιμία του μυοκαρδίου, εικόνα λήψης ψυχοδραστικών ουσιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017 - ΑΤΤΙΚΗ: ΔΥΟ ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ QUETIAPINE ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

1. Άνδρας 53 ετών, χρήστης ναρκωτικών. Στα βιολογικά υλικά (ούρα και αίμα) ανιχνεύθηκαν 1) codeine, meconin, morphine, 6 MAM, μεταβολίτης της paraverine, hydrocotarnine (οπιούχα παράγωγα), 2) flunitrazepam, 3) **quetiapine** (ούρα), 4) **tramadol** (αναλγητικό οπιοειδές), 5) παρακεταμόλη, καφεΐνη (αναλγητικά). Αιτία θανάτου: Ισχαιμία μυοκαρδίου συνεπεία λήψης εξαρτησιογόνων ουσιών (ηρωίνη) και φαρμάκων.
2. Άνδρας 46 ετών. Στα βιολογικά υλικά (αίμα) ανιχνεύθηκαν 1) μεθαδόνη και μεταβολίτης της (EDDP), 2) **biperiden**, 3) mirtazapine (αντικαταθλιπτικό), 4) μεταβολίτης της **quetiapine**, 5) diazepam, nordazepam (βενζοδιαζεπίνες-αγχολυτικά και υπνωτικά φάρμακα), 6) αλκοόλ 0,13‰ (gr/Lt). Αιτία θανάτου: Πρόσφατη ισχαιμία μυοκαρδίου.
3. Άνδρας 36 ετών. Στα βιολογικά υλικά (αίμα, ούρα) ανιχνεύθηκαν 1) κοκαΐνη και μεταβολίτες της, 2) diazepam, alprazolam, nordazepam, temazepam (βενζοδιαζεπίνες), meconin, codeine, morphine (οπιούχα παράγωγα), 3) **quetiapine** (αντιψυχωσικό), 4) chloroquine (ανθελνοσσιακό φάρμακο), 5) trifluoperazine, levomepromazine (αντιψυχωσικά), **biperiden**, **dextromethorphan** (αντιβηχικό οπιοειδές). (Προσωρινή) Αιτία θανάτου: Πρόσφατη ισχαιμία του μυοκαρδίου. Επίσης, δίπλα στον θανόντα βρέθηκε **σύριγγα** που περιείχε οπιούχα παράγωγα, κοκαΐνη, αναλγητικά φάρμακα και **quetiapine**.

<p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017 ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ</p> <p>Η quetiapine ανιχνεύθηκε σε επτά από τα δείγματα που λήφθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 8-14/03/2017.</p>	<p>ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ</p>
<p>PREGABALIN</p> <p>ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016 - ΑΤΤΙΚΗ: ΕΝΑΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PREGABALIN ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΥΣΙΩΝ</p> <p>Γυναίκα 44 ετών. Στα βιολογικά υλικά (αίμα και ούρα) ανιχνεύθηκαν 1) codeine, meconin, morphine (οπιούχα παράγωγα), 2) flunitrazepam, diazepam, nordazepam (βενζοδιαζεπίνες-αγχολυτικά και υπνωτικά φάρμακα), 3) mirtazapine (αντικαταθλιπτικό φάρμακο), 4) pregabalin (φάρμακα του ΚΝΣ- αντιεπιληπτικά φάρμακα). Αιτία θανάτου: Πνευμονικό οίδημα-ισχαιμία του μυοκαρδίου συνεπεία λήψης οπιούχων και συνέργειας φαρμάκων. Ο θάνατος συνέβη σε περιοχή της Αττικής.</p>	<p>ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ</p>
<p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017 ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ</p> <p>Η pregablin ανιχνεύθηκε σε επτά από τα δείγματα που λήφθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 8-14/03/2017.</p>	<p>ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ</p>
<p>ΝΕΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΥΣΙΩΝ: PREGABALIN (LYRICA)+ΗΡΩΪΝΗ</p> <p>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017</p> <p>Διάδοση: Πάρα πολύ διαδεδομένος συνδυασμός ουσιών Ομάδα στόχος: Πολυ-χρήστες Παρενέργειες / επιδράσεις: Λογόρροια Χρήση από τον ερωτώμενο: Ναι</p>	<p>ΘΜΦΑΕ ΟΝΑΝΑ- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ</p>

<p>ΝΕΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΥΣΙΩΝ: PREGABALIN (LYRICA)+VULBEGAL</p>	
<p>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017</p> <p>Αριθμός αναφορών: 2 Διάδοση: Πολύ/πάρα πολύ διαδεδομένος συνδυασμός ουσιών Ομάδα στόχος: Χρήστες βενζοδιαζεπινών Παρενέργειες / επιδράσεις: «Βουητό στο κεφάλι», αστάθεια, μείωση στερητικών από χρήση άλλων ουσιών Χρήση από τους ερωτώμενους: Ναι</p>	<p>ΘΜΦΑΕ ΟΝΑΝΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ</p>
<p>VENLAFAXINE</p> <p>ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016 - ΑΤΤΙΚΗ: ΔΥΟ ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ VENLAFAXINE ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΥΣΙΩΝ</p> <ol style="list-style-type: none"> Ανδρας 50 ετών. Στα βιολογικά υλικά (αίμα) ανιχνεύθηκαν 1) codeine, morphine, 6MAM (οπιούχα παράγωγα), 2) mirtazapine (αντικαταθλιπτικό φάρμακο), 3) venlafaxine και μεταβολίτης της (αντικαταθλιπτικό). Αιτία θανάτου: Πρόσφατες ισχαιμικές αλλοιώσεις μυοκαρδίου-πνιγμονή εκ βλωμού τροφής-λήψη ψυχοδραστικών ουσιών. Ανδρας 25-30 ετών. Στα βιολογικά υλικά (αίμα και ήπαρ/χολή σε σήψη) ανιχνεύθηκαν 1) meconin, codeine, morphine (οπιούχα παράγωγα), 2) οινόπνευμα 0,19 ‰ (gr/Lt), 3) venlafaxine και μεταβολίτης της (αντικαταθλιπτικό). Αιτία θανάτου: Λήψη εξαρτησιογόνων ουσιών. 	<p>ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ</p>
<p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017 ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ</p> <p>Η venlafaxine ανιχνεύθηκε σε επτά από τα δείγματα που λήφθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 8-14/03/2017.</p>	<p>ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ</p>

GHB & GBL	
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 2017 Συνολικό αριθμός: 8. Κλήσεις από Δημόσια Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας και από το Κέντρο Υγείας της Μυκόνου <ol style="list-style-type: none"> 1. Άνδρας, χρήστης ουσιών, 44 ετών. Χρήση GHB από μύτη (σνιφάρισμα) (25/4/2017). Συμπτώματα: Ταχυκαρδία. 2. Μακροχρόνιος χρήστης GHB, 26 ετών (19/5/2017) . Συμπτώματα: Διέγερση, ανησυχία. Συμπτωματική αγωγή 3. Άνδρας 31 ετών, αλλοδαπός (Άραβας), χρήση GHB σε συνδυασμό με λάδια αυτοκινήτου 4. Άνδρας 30 ετών, αλλοδαπός (Μαροκινός), κατάπνε υγρό GHB (1/9/2017). Διακομήθηκε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγ. Ανάργυροι με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. <u>Διασωληνώθηκε</u>. Κατόπιν, μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση. 5. Άνδρας 26 ετών, χρήση GHB σε συνδυασμό με pregabalin (Lyrica) και baclofen (μυοχαλαρωτικό) (20/6/2017). Συμπτώματα: Κώμα. Συνήθλε με τη χορήγηση του φαρμακευτικού σκευάσματος ANEXATE (ανταγωνιστής βενζοδιαζεπινών) 6. Άνδρας, 60 ετών, χρήση GHB. Συμπτώματα: Μύση. 7. Άνδρας 34 ετών, χρήστης ουσιών. Χρήση GBL από το στόμα, ενδοφλέβια χρήση μεθαμφεταμίνης και methedrone/bk-PMMA (καιθινόνη) από τη μύτη. Συμπτώματα: Δυσφορία, δύσπνοια, μυικός τρόμος, διέγερση. 8. Άνδρας 27 ετών, χρήση GBL σε χυμό. Συμπτώματα: Δύσπνοια, ταχυκαρδία, δυσφορία, σφυγμοί= 117 ανά λεπτό, μυοκλονίες. 	ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
GABAPENTIN ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017 ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ Η gabapentin ανιχνεύθηκε σε επτά από τα δείγματα που λήφθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 8-14/03/2017. Φαρμακευτικό σκεύασμα: Neurontin, αντιεπιληπτικό	ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΤΟΜΕΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017 Τρόπος χρήσης: Σνιφάρισμα Ομάδα-στόχος: Όσοι πειραματίζονται με ουσίες	ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝΑ- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

<p>Diphenhydramine</p> <p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017 ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ</p> <p>Η ουσία ανιχνεύθηκε σε πέντε από τα δείγματα που λήφθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 8-14/03/2017.</p> <p><i>Η Diphenhydramine ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2017. Αντιισταμινικό.</i></p>	<p>ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ I ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ</p>
<p>ΦΥΤΑ & ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ</p>	
<p>SALVIA DIVINORUM</p> <p>Χημική Ονομασία: Divinorin A Βάρος: 18,9 γρ. Μορφή: Φύλλα αποξηραμένα τα οποία περιέχονταν σε χάρτινη συσκευασία με τις ενδείξεις HERBS OF THE GODS 20 grams-Amsterdam Φορέας κατάσχεσης: Τ.Α. Αγ. Παρασκευής Ημερομηνία κατάσχεσης: 2017 Μέθοδος εξέτασης δείγματος: GC/MS</p>	<p>ΓΧΚ (ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, Β ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)</p>
<p>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017</p> <p>Αριθμός αναφορών: 6 Μορφή: Φύλλα φυτού Τρόπος χρήσης: Καπνιστή Διάδοση: Πολύ διαδεδομένη ουσία (3), λίγο διαδεδομένη, ελάχιστα διαδεδομένη Επιδράσεις / παρενέργειες: Ψευδαισθήσεις, αίσθηση υπερφυσικής δύναμης, αδυναμία αντίδρασης, κίνησης και λόγου, «χάσιμο», απώλεια μνήμης, λιποθυμία Ομάδα στόχος: Χρήστες κάνναβης και νέοι χρήστες Χώροι διάθεσης: Πιάτσες στην Αθήνα, διαδίκτυο. Σύμφωνα με μια αναφορά, πωλείται σε ανθοπωλείο (επειδή είναι νόμιμη ουσία) Χρήση της ουσίας από ερωτώμενους: Ναι (N=3), Όχι (N=2)</p>	<p>ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ</p> <p>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ</p>

ΚΑΒΑ ΚΑΒΑ (ΚΑΝΑ ΚΑΝΑ)**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017**

ΜΥΑΠ, ΟΚΑΝΑ

Μορφή: Ρίζα φυτού**Τρόπος χρήσης:** Κατάποση**Διάδοση:** Ελάχιστα διαδεδομένη ουσία**Επιδράσεις / παρενέργειες:** Υπερβολική διέγερση**Χώροι/μέσα διάθεσης:** Χώροι νυχτερινής διασκέδασης της Αθήνας**Χρήση της ουσίας από ερωτώμενο:** Ναι**B.**

- **ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ («ΣΙΣΑ»)**
- **ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ**
- **ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΟΥΣΙΩΝ**

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ («ΣΙΣΑ»)**A. ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ (2012-2016)**

ΕΤΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ	ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2012	105	962 γρ.
2013	70	14.580 γρ. Μία υπόθεση αφορούσε σε 12 περίπου κιλά κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.
2014	54	4.872 γρ.
2015	101	673,2 γρ.
2016	52	691,65 γρ.
2017	8	99,4 γρ.

Πηγές πληροφόρησηςΣΟΔΝ-ΕΜΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

B. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 2016-2017

Αναφέρθηκαν πέντε (N=5) **θανατηφόρα** περιστατικά στην **Αττική**, τέσσερα έλαβαν χώρα το 2017 και ένα το 2016. Η ηλικία των θανόντων κυμαίνεται μεταξύ 32 και 39 ετών. Τέσσερις είναι άνδρας και μία γυναίκα. Στα βιολογικά υλικά των θανόντων ανιχνεύθηκαν μεθαμφεταμίνη και άλλες ουσίες, κυρίως οπιούχα παράγωγα. Η χρήση ουσιών συνέργησε στην πρόκληση των θανάτων.

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1ο Περιστατικό 2016: Άνδρας, 34 ετών στα βιολογικά υλικά (αίμα και ούρα) του οποίου βρέθηκαν **μεθαμφεταμίνη**, οπιούχα παράγωγα (codeine, meconin, morphine), παρακεταμόλη και αλκοόλ 0,17 ‰ (gr/Lt). Αιτία θανάτου: βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κακώσεις θώρακος και λεκάνης (κατά πληροφορίες πτώση εξ ύψους).

2ο Περιστατικό 2017: Άνδρας, 32 ετών στα βιολογικά υλικά (ούρα) του οποίου βρέθηκαν **μεθαμφεταμίνη**, οπιούχα παράγωγα (codeine, meconin, morphine) και μεταβολίτης methadone. Αιτία θανάτου: πρόσφατες ισχαιμικές αλλοιώσεις του μυοκαρδίου.

3ο Περιστατικό 2017: Άνδρας, 39 ετών στα βιολογικά υλικά (ούρα και αίμα) του οποίου βρέθηκαν **μεθαμφεταμίνη** (ούρα), οπιούχα παράγωγα (codeine, morphine), βενζοδιαζεπίνες (diazepam, nordazepam), olanzapine (αντιψυχ. φάρμακο), rhenacetin (αναλγητικό), κοκαΐνη και μεταβολίτες της. Αιτία θανάτου: ισχαιμία του μυοκαρδίου, λήψη εξαρτησιογόνων ουσιών.

4ο Περιστατικό 2017: Γυναίκα, 32 ετών στα βιολογικά υλικά (αίμα και ούρα) της οποίας βρέθηκαν **μεθαμφεταμίνη**, methadone και μεταβολίτης της, βενζοδιαζεπίνη (flunitrazepam και μεταβολίτης της), **quetiapine** και **pregabalin** (αντιεπιληπτικά φάρμακα). (Προσωρινή) αιτία θανάτου: οίδημα-συμφόρηση πνευμόνων.

5ο Περιστατικό 2017: Άνδρας, 39 ετών στα βιολογικά υλικά (αίμα και ούρα) του οποίου βρέθηκαν **μεθαμφεταμίνη** (ούρα), **biperiden**, οπιούχα παράγωγα (codeine, meconin, morphine, 6-monoacetylmorphine –μεταβολίτης ηρωίνης, hydrocotarnine, thebaol, μεταβολίτης της papaverine), παρακεταμόλη και καφεΐνη. Αιτία θανάτου: οίδημα πνευμόνων, λήψη εξαρτησιογόνων ουσιών.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 2017	
Περιστατικό: Η Μεθαμφεταμίνη ανιχνεύθηκε στα βιολογικά υλικά (ούρα) ενός οδηγού που ενεπλάκει σε τροχαίο ατύχημα το οποίο έλαβε χώρα στην περιοχή της Αττικής. Ο οδηγός είναι εν ζωή.	ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Γ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2017	
Ανδρας 52 ετών (ήταν σε Πρόγραμμα Υποκ/σης), χρήση Vulbegal και Κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης. Συμπτώματα: Υπνηλία (κλήση από Νοσοκομείο ΘΡΙΑΣΕΙΟ). Χορήγηση ANEXATE.	ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017	
<p>Αριθμός αναφορών χρηστών: 41 (2016, N=38)</p> <p>Δοκιμή/χρήση της ουσίας από τους ερωτώμενους: Τριάντα (34) άτομα είχαν χρησιμοποιήσει μία ή περισσότερες φορές ΣΙΣΑ και επτά (7) άτομα είχαν μόνο ακούσει για αυτή την ουσία.</p> <p>Μορφή: κρυσταλλική ουσία (N=35), σκόνη (N=4), «άσπρα βραχάκια» (N=2)</p> <p>Τρόπος χρήσης: <u>Ενδοφλέβια</u> (N=36), καπνιστή (N=3), σνιφάρισμα (N=1), βρώση (1)</p> <p>Ομάδες στόχος: Πολυχρήστες (N= 16), χρήστες σε Θ.Π. (N=7), χρήστες ηρωίνης / κοκαΐνης (N=3), μακροχρόνιοι χρήστες (N=2), νεαροί χρήστες</p> <p>Επιδράσεις / παρενέργειες: Επιθετικότητα (N=9), ψευδαισθήσεις (N=7), νευρικότητα (N=3), παράνοια (N=2), λογόρροια (N=2), δερματικά προβλήματα, θάνατος (N=2), φοβίες, ταχυπαλμία, υπερκινητικότητα, υπερένταση,</p> <p>Χώροι διάθεσης: «Πιάτσα»</p> <p>Διάδοση: Πάρα πολύ / πολύ διαδεδομένη (στην Αθήνα και στη Ρόδο).</p>	<p>ΘΜΦΑΕ ΟΝΑΝΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ (ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ=34)</p> <p>ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ</p> <p>ΜΥΑΠ ΟΚΑΝΑ</p> <p>ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΙΑΝΟΣ, ΨΝΘ</p>
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΥΣΙΩΝ: ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ+ΗΡΩΙΝΗ	
<p>Τρόπος χρήσης: Ενέσιμο</p> <p>Χρήση από τον ερωτώμενο: Όχι</p>	ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗΣ ΜΕ QUETIAPINE (SEROQUEL) Η ALPRAZOLAM (XANAX)

Τρόπος χρήσης: Καπνιστή κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη και από το στόμα την quetiapine ή alprazolam. Χρησιμοποιούν παράλληλα την quetiapine για να κατεναύσουν τα συμπτώματα της κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ενώ την alprazolam ταυτόχρονα για μεγαλύτερη ενέργεια ως υποκατάστατο της κοκαΐνης.

Χώροι διάθεσης: Πιάτσες (υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα στην παράνομη αγορά σε quetiapine που είναι φθηνότερη από την πρέζα)

Χρήση από τον ερωτώμενο: Ναι

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝΑ-
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Ε. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (2009-2016)**ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗΣ ΩΣ ΚΥΡΙΑΣ Η ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΟΥΣΙΑΣ**

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δείκτη, από το 2011 παρουσιάζεται σημαντική αύξηση του αριθμού των ατόμων που αιτούνται θεραπεία οι οποίοι ανέφεραν ως κύρια ή δευτερεύουσα ουσία την μεθαμφεταμίνη σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

ΕΤΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ
2009	4
2010	5
2011	20
2012	44
2013	50
2014	76
2015	72
2016	82 (22 άτομα ανέφεραν την μεθαμφεταμίνη ως κύρια ουσία χρήσης)

ΟΥΣΙΑ «ΤΑΪ»**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017**

Αριθμός αναφορών χρηστών: 3

Μορφή: μπαλάκι (N=2), δισκίο

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝΑ-
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

<p>Τρόπος χρήσης: ενδοφλέβια. Ένας στους τρεις ανέφερε καθημερινή ενδομυϊκή χρήση για 3 μήνες μαζί με κοκαΐνη στην ίδια σύριγγα (διεγερτική δράση)</p> <p>Διάδοση: Πάρα πολύ διαδεδομένη</p> <p>Επιδράσεις/ παρενέργειες: Παρόμοιες με της ηρωίνης.</p> <p>Ομάδα στόχος: Χρήστες ηρωίνης, μακροχρόνιοι/προβληματικοί χρήστες ουσιών</p> <p>Χώροι διάθεσης: Πιάτσες, διαδίκτυο</p> <p>Δοκιμή/χρήση της ουσίας από τους ερωτώμενους: Ναι (N=2), Όχι (N=1)</p>	<p>ΜΥΑΠ, ΟΚΑΝΑ</p> <p>ΙΑΝΟΣ ΨΝΘ</p>
<p>CROCODIL</p> <p>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017</p> <p>Μορφή: Σκόνη</p> <p>Τρόπος χρήσης: Ενδοφλέβια</p> <p>Διάδοση: Ελάχιστα διαδεδομένη ουσία</p> <p>Επιδράσεις/ παρενέργειες: Παρόμοιες με της ηρωίνης</p> <p>Ομάδα-στόχος: Μακροχρόνιοι/προβληματικοί χρήστες ουσιών</p> <p>Χώροι διάθεσης: Διαδίκτυο</p> <p>Δοκιμή/χρήση της ουσίας από τον ερωτώμενο: Ναι (από αυτόν που προμηθεύτηκε τα δισκία δεν δέχτηκε να τα διαθέσει στην παράνομη αγορά)</p>	<p>ΜΥΑΠ, ΟΚΑΝΑ</p>
<p>ΧΑΠΙΑ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ</p> <p>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017</p> <p>Μορφή: Δισκία</p> <p>Τρόπος χρήσης: Κατάποση</p> <p>Επιδράσεις/ παρενέργειες: Βιαιότητα, επιθετικότητα, σεξουαλική διέγερση</p> <p>Χώροι διάθεσης: Διαδίκτυο, πιάτσες</p> <p>Δοκιμή/χρήση της ουσίας από τον ερωτώμενο: Όχι</p>	<p>ΜΥΑΠ, ΟΚΑΝΑ</p>

<p>LAUGHING GAS (υποξειδίο του αζώτου -nitrogen epoxide / nitrous oxide)</p> <p>ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2017</p> <p>Περιστατικό που νοσηλεύονταν στην Εντατική Μονάδα Παίδων του ΠαΓΝΗ στην Κρήτη το καλοκαίρι του 2017. Πρόκειται για μία νεαρή Αγγλίδα 18 ετών που προσκομίστηκε στο Νοσοκομείο σε κώμα και νευρολογική συνδρομή εγκεφαλικής υποξίας. Από τα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα και από το ιστορικό οι γιατροί του Νοσοκομείου και του Κέντρου Δηλητηριάσεων κατέληξαν στη διάγνωση δηλητηρίασης μετά από εισπνοή πιθανότατα μεγάλης ποσότητας υποξειδίου του αζώτου (nitrogen epoxide / nitrous oxide) .</p> <p>Το περιστατικό αυτό καλύφθηκε εκτενώς και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σε δημοσιεύματα αναφέρθηκε ότι η νεαρή γυναίκα έκανε ταυτόχρονα και μεγάλη χρήση αλκοόλ.</p> <p><i>Παρατηρήσεις: Το υποξείδιο του αζώτου είναι μία ουσία που χρησιμοποιούνταν στην εισαγωγή αναισθησίας, αλλά τελευταία χρησιμοποιείται μεταξύ των νέων κατά τη διάρκεια της νυχτερινής διασκέδασης. Έχει συγγένεια με τους μ και κ υποδοχείς των οπιούχων και προκαλεί εθισμό. Στη χώρα μας η ουσία αυτή καταναλώνεται κυρίως σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς (π.χ. Κρήτη, Ζάκυνθο, κλπ.) κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Το υποξείδιο του αζώτου είναι γνωστό ως «αέριο του γέλιου» (laughing gas) λόγω των ευφορικών και αγχολυτικών του επιδράσεων. Η ουσία διατίθενται σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης σε μπαλόνια ή μικρά μεταλλικά δοχεία.</i></p>	<p>ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ</p>
<p>ΓΚΑΖΑΚΙΑ</p> <p>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟ 2017- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ</p> <p>(Γυναίκα 18 ετών, χρήστης μάλλον υποξειδίου του αζώτου η οποία επιπλέον έχει κάνει χρήση κάνναβης, κοκαΐνης και ηρωίνης)</p> <p>Μορφή: Φιαλίδιο Τρόπος χρήσης: Εισπνοή Διάρκεια δράσης: Η χρήση ενός φιαλιδίου διαρκεί περίπου μισή ώρα. Επιδράσεις/ παρενέργειες: έγινε συστηματική χρήση της ουσίας για τρία χρόνια με 1-2 φιαλίδια την ημέρα και το τελευταίο διάστημα με 5-10 φιαλίδια την ημέρα από τη νεαρή γυναίκα και παρουσίασε τα ακόλουθα συμπτώματα: Έντονες αντιληπτικές διαταραχές (οπτικές και ακουστικές παραισθήσεις και ψευδαισθήσεις), ιδέες συσχέτισης και αυτοαναφοράς (παραληρηματικές ιδέες), μεγάλες διαταραχές των γνωστικών λειτουργιών (μνήμη, συγκέντρωση και προσοχή) και του προσανατολισμού. Δίνει την εντύπωση σύγχυσης και νοητικής υστέρησης. Το νεαρό άτομο έχει ιστορικό ψυχωτικού επεισοδίου σε περίοδο αποχής και έχει νοσηλευτεί σε παιδοψυχιατρική κλινική Δοκιμή/χρήση της ουσίας από τον ερωτώμενο: ΝΑΙ μαζί με μία 16χρονη φίλη της.</p>	<p>ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ</p>